Sechstes Verzeichniß

jener Pflanzen, welche bei P. M. Opiz, Altstadt, Ritter-gasse Nro. 539 zum Tausch oder Kauf*) unter den im Kratos — und der botanischen Zeitung bekannt gemachten Bedingnissen vorräthig sind, und nur dann ausgefolgt werden, wenn alle Einsendungen kostenfrei geschehen, und zur Besorgung der Gegensendungen verhältnißmäßige Geldvorschüße erfolgen. Die Fortsetzung dieses Verzeichnisses folgt nach Erlag von 12 kr. C. M.

Sphaeria ferruginea. Pers. (Semin. Opiz.) — Lichenum. (Stern. Opiz.) — Sambuci. (Radius.) — Dematium. (Cöln. Sehlmeyer.) — Laburni. (Krummau. Jungbauer.) — acuta nuda. (Stern. Benesch.) — nivea. (Karlstein. Opiz.) — fimbriata. (Krummau. Jungbauer.) — distans. (Krummau. Jungbauer.) — Trifolii. (Prag. Jacob Böhm.) — Anethi. (Gerhard) — typhina. (Prag. Moschner.) — placenta. (Leipzig. Reichenbach.) — graminis. (Leipzig. Reichenbach.) — Aegopodii. (Leipzig. Reichenbach. Pardubic. Opiz.) — Ostruthii. Fries. (Georgenstadt. Radius.) — cinnabarina. Tode. (Gerhard.) — circumscripta. Kunze. (Gerhard.) — Coryli. Batsch. (Gerhard.) — inquinans. Pers. (Gerhard.) — — longissima. Pers. (Gerhard.) — salicina. P. (Gerhard.) — *Sphaerophoron* coralloides. (Jäschken. Opiz.) — fragile. (Jäschken. Opiz.) — *Sphagnum* compactum. Briedel. (Breslau. Wimmer.) — subsecundum. Nees. (Krummau. Jungbauer.) — squarrosum. Pers. (Blansko. Jungbauer.) — acutifolium. (Slawětin. Eisenstein.) — cuspidatum. (Cöln. Sehlmeyer.) — obtusifolium. (Semin. Opiz.) — *Spilanthus* oleraceus. L. (Kostelecky. C. Bartenstein.) — *Spiraea* Aruncus. L. (Lampersdorf. Kriz. Hohenfurth. Nenning.) — chamaedrifolia. L. (Mann.) — *Sparganium* ramosum. Smith. (Prag. Kostelecky.) — simplex. Smith. (Dussnik. Chotek.) — *Spergula* pentandra. L. (Niesky. Burkhardt.) — *Sphaeria* flaccida. A. et S. (Krummau. Jungbauer.) — *Spiraea* Filipendula. L. (Chotek.) — salicifolia. L. (Kostelecky. Seidl. Wagner.) — Ulmaria. L. (Böheim. Mann.) — hypericifolia. L. (Masner.

*) Die Centurie à 4 fl. C. M., nebst Vergütung aller Unkosten.

Mann.) — sorbifolia. L. (Hentschel.) — denudata. Presl. (Slawětin. Eisenstein. Manchmal beginnen die Blätter am Außenrande der Unterfläche, filzig zu werden, wie ich dieß auf einer Wiese in der Gegend von Pardubic beobachtet habe. Opiz.) — laevigata. L. (Günther.) — *Splachnum* Braunianum. Opiz. [13]) (Salmshöhe. F. v. Braun.) — ampullaceum. L. (Cöln. Sehlmeyer.) — urceolatum. (F. v. Braun. Paster. C. Bartenstein.) — Frölichianum. (F. v. Braun. Heiligenblut. Bartenstein.) — muioides vom Hrn. D. F. v. Braun ist S. apiculatum. Opiz. [14]) — *Stachys* lanata. Aiton. (Austerlitz.) — alpina. L. (Ofenlochberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — annua. L. (Nußle. Opiz.) — arabica. Bellard. (Kostelecky.) — *Stapelia* radiata. Sims. (Walter.) — *Statice* Armeria. Auct. germ. (Žižkaberg. Mann.) — latifolia. Smith. (F. v. Braun.) — maritima. Miller. (Mann.) — *Stachys* arvensis. L. (Minden. Weihe.) — palustris. L. (Prag. Kostelecky.) — recta. L. (Prag. Kostelecky.) — sylvatica. L. (Slawětin. Eisenstein.) — *Stellaria* palustris. Rez. (Schönfeld. Gerhard.) — *Stellera* passerina. L. (Gastorf. Neumann. Ofen. Lang. Lissa. Kostelecky.) — *Stellaria* graminea. L. (Prag. Kostelecky.) — Holostea. L. (Scharka. Opiz.) — nemorum. L. (Stiřin. Sykora.) — crassifolia. Ehrh. (Mennighüffen. Weihe.) — *Stellera* passerina v. caule ramoso. (Regensburg. Fürnrohr.) — *Stemonitis* fasciculata (Krummau. Jungbauer.) — *Stereocaulon* vesuvianum. (Malnizertauern. C. Bartenstein.) — paschale. (Minden. Weihe. Wotic. Maly. Mann.) — nanum. (Kaisermühle. Benesch.) — *Stevia* purpurea. W. (Günther. Adamowsky.) — Eupatorium L. (Günther.) — ovata. Willd. (Günther.) — *Sticta* pulmonacea. (Krummau. Jung-

---

[13]) *Splachnum* caule stuposo, caespitoso; foliis ovatis, mucronatis, concavis; apophysi oblongo-ovali, latiore quam theca. Opiz.

[14]) *Splachnum* caule subsimplici; foliis lanceolatis, longe apiculatis, apice subserrulatis, evanidi nervibus; seta recta, foliis multolongiore; apophysis obconica. Opiz. Auf dem Wazmann im Berchtesgaden. Dr. Fr. v. Braun.

bauer. Wolfsberg. Opiz.) — *Stipa* capillata. L. (Prag. Mann.) — *Stratiotes* aloides. L. (Minden. Weihe.) — *Struthiopteris* germanica. (Salzburg. Hinterhuber.) — *Succovia* balearica. (Kostelecky.) — *Swertia* perennis. L. (Mariazell. Hölzel.) — *Symphoricarpos* vulgaris. Mich. (Walter) — *Symphitum* tuberosum. L. (Leitmeriz. Hackl.) — *Syntherisma* aegyptiacum. (Kostelecky.) — *Syntrichia* ruralis. (St. Prokop. Opiz.) — subulata. (Stern. Opiz.) — *Syringa* persica. L. (Maly.) — vulgaris. L. (Kostelecky.) — chinensis. W. (Seidl.) — *Tagetes* micrantha. Cav. (Kostelecky.) — minuta. (Günther.) — patula fl. pleno. (Chotek.) — erecta. L. (Kostelecky.) — lucida. Cav. (Günther.) — *Tamarix* germanica. L. (Frenstadt. Grabowsky.) — *Tanacetum* boreale. H. Gor. (Prag. Masner.) — vulgare. L. (Kaiserwiese. Opiz. Böhmischaicha. Prochaska.) — *Teesdalia* nudicaulis. R. Br. (Minden. Weihe.) — *Tetragonia* expansa. Thunb. (Kostelecky.) — *Tetraphis* pellucida. (Isergebirg. Opiz.) — cylindrica. (Heiligenblut. C. Bartenstein.) — *Teucrium* Chamaedrys. L. (Laurenzberg. Opiz.) — marum. L. (Neuning.) — *Thalictrum* angustifolium. L. (Lobkowic. Kostelecky. Lausitz. Burkhard.) — gallioides. Nestler. (Günther.) — medium. Jacq. (Steudel.) — minus. L. (Dresden. Bauer.) — rugosum. Aiton. (Günther.) — discolor. W. (Günther.) — polygamum. (Günther.) — *Thelaephora* accrina. Pers. (Baumgarten. Opiz.) — hirsuta. (Baumgarten. Opiz. Stern. Austerliz.) — *Theligonum* cynocrambe. L. (Kostelecky.) — *Thesium* ebracteatum. Heyne. (Berlin. Schlechtendahl.) — alpinum. L. (Admont. Semmerauer.) — Linophyllum. L. (Leitmeriz. Kauble; Baumgarten. Opiz.) — *Thlaspi* alpestre. L. (Schneeberg. Reinegger.) — alpinum. L. (Mariazell. Hoelzel.) — Bursa pastoris simplicifolia. Pers. (Hezinsel. Benesch.) — arvense. L. (Prag. Kostelecky.) — campestre. L. (Baumgarten. Opiz. Prag. Eisenstein.) — perfoliatum. L. (Podbaba. Opiz.) — saxatile. L. (Walter. Gainfahrn. Reinegger.) — coerulescens. Presl. (Prag. Mann.) — *Thrincia* hirta. Roth. (Bergedorf bei Hamburg. Lindenberg.) — *Thuja* sphaeroidalis. Rich. (Neumann.) — occidentalis. L. (Prochaska.) — *Thymus* austriacus. Beruh.

(Prag. Mann.) — pilosus. Opiz. [15]) (Laurenzberg. Masner.) — praecox. Opiz. [16]) (Troja. Masner.) — sylvestris. Schreb. (Kuchelbad. Austerliz. Prag. Wagner.) — angustifolius. Schreber. (Prag. Mann.) — *Tiarella* cordifolia. L. (Sehlmeyer.) — *Tilia* americana. L. (Mann.) — europaea. W. (Maly.) — grandifolia, foliis subtus glabris. (Maly.) — parvifolia. (Prag. Kostelecky.) — *Toffieldia* palustris. Huds. (Schweiz. Burckhardt. Blansko. Jungbauer.) — rubra. Braun. (Salzburg. F. v. Braun.) — *Torilis* trichosperma. Sprengl. (Prag. Masner.) — Anthriscus. Gmel. (Gráz. Speckmoser.) — *Tozzia* alpina. L. (Untersberg. Hinterhuber.) — *Tradescantia* virginiana. L. (Kostelecky.) — erecta. Cav. (Kostelecky.) — *Tragopogon* major. Jacq. (Prag. Mann.) — *Trapa* natans. L. (Czaslau. Streinz.) — *Tremella* Nostoc. (Kossič. Benesch.) — *Trichera* arvensis. Schrad. (Prag. Mann.) — *Trichodium* caninum. β. Schrad. (Minden. Weihe.) — caninum. ζ Schrad. (Minden. Weihe.) — laxiflorum. Mich. (Weihe.) — *Trichostomum* ovatum. (Scharka. Opiz.) — canescens. (Isergebirg. Opiz.) — fontinaloides. (Pardubic. Opiz.) — latifolium. (Heiligenblut C. Bartenstein.) — pulvinatum. (Prag. Opiz. Ramisch.) — *Trifolium* flexuosum. Jacq. (Prag. Kostelecky.)

---

[15]) *Thymus* caule repente; ramis prostratis, pilis brevibus, patentissimis obtectis; foliis oblongis, superioribus obvatis vel oblongis, petiolatis, utrinque pilosis, ciliatis; floribus capitato-spicatis; pedunculis pilis brevissimis, deflexis, obsitis; calicibus pilosis; dentibus calicinis longeciliatis; corollis tubo calicino longioribus; staminibus corolla longioribus. Opiz. Troja. Austerliz. Differt a T. ciliato. Opiz. cui similis, foliis angustioribus. Opiz.

[16]) *Thymus* caule repente; ramis adscendentibus, pilis patentibus; foliis obovatis, obtusiusculis, subtus lineatis; petiolis pilis longissimis, margineque ciliatis; foliis floralibus subsessilibus latioribus, corollis calice longioribus; staminibus inclusis. Opiz. Pokratic Leitmeritzer Kreises. Hr. Professor Hackl.

— pannonicum. L. (Mann.) — pictum. Roth. (Maly.) — procumbens. L. (Berlin. Schlechtendahl; Prag. Kostelecky.) — resupinatum. L. (Kostelecky.) — striatum. L. (Leipzig. Reichenbach.) — agrarium. L. (Einsiedel. Petters.) — alpestre L. (Podbaba. Opiz.) — arvense. L. (Prag. Kostelecky.) — hybridum. L. (Prag. Kostelecky) — incarnatum L. (Maly.) — montanum. L. (Prag. Kostelecky.) — albidum. Rez. (Kostelecky.) — glomeratum. L. (Kostelecky. Eisenstein.) — lappaceum L. (Maly.) — pratense. L. (Prag. Kostelecky.) — rubens. L. (Kuchelbad. Palliardi.) — spadiceum. L. (Grulich. Opiz; Stiřin. Sykora.) — purpureum. Lois. (Krummau. Bayer.) — vesiculosum. Savi. (Maly.) — stellatum. L. (Kostelecky.) — campestre. Schreber. (Prag. Kostelecky.) — aristatum. Balbis. (Maly. Kostelecky.) — alopecuroides. Pers. (Kostelecky.) — *Trigonella* flexuosa. Delil. (Kostelecky.) — oxyrynchos. (Kostelecky). — *Triglochin* palustre. Lin. (Weleslawin bei Prag. Opiz.) — maritimum L. (Kötschau. Gerhard.) — *Trigonella* foenum graecum. L. (Kostelecky. — pinnatifida Cav. (Weihe.) — polycerata. L. (Kostelecky.) — platycarpos. L. (Kostelecky.) — *Trisetum* Airoides. Kölle. (Weihe.) — alpestre. Host. (Grätz. Speckmoser.) — pubescens. (Leipzig. Gerhard.) — pratense. (Prag. Kostelecky.) — *Triticum* compactum aristatum. Schübler. (Kostelecky.) — compositum L. (Moschner.) — creticum. R. et S. (Kostelecky.) — densiflorum. Willd. (Speckmoser.) — desertorum. (Weihe.) — diccocum aristatum. (Kostelecky.) — elymoides. Hornemann. (Kostelecky.) — erinaceum (Kostelecky.) — fastuosum Lagasc. (Kostelecky) — pilosum. Scenus. (Kostelecky.) — sativum aestivum. (Mann) — sibiricum. Schübler. (Weihe.) — Spelta nigra. Walter. (Walter.) — spuarrosum. Roth. (Kostelecky.) — tricoccon aristatum. (Kostelecky.) — variegatum. Fischer. (Weihe.) — villosum. Beauv. (Günther. Maly.) — caninum. L. (Hohenfurth tabor. Kr. Nenning. Unersdorf bei Berlin. Walter.) — hyberuum. L. (Bayer.) — repens L. (Prag. Kostelecky.) — tenellum. Lam. (Kostelecky.) — pectinatum R. Br. (Mann. Grabowsky.) — Bauhini. Lagasc. (Kostelecky.) — Cevallos. Lagasc. (Weihe. Kostelecky.) — Cien-

fuegos. Lagasc. (Kostelecky) — giganteum. DeC. (Günther.) — mucronatum. Opiz. [17]) (Prag. Mann.) — *Trollius* europaeus. L. (Maly. — Sittendorf nächst Wien. Winkler) — *Tropaeolum* majus. L. (Mann.) — minus. L. vom Hrn. Apotheker C. Barteustein ist T. majus. L. Mann. — *Tubercularia* Laburni. Opiz. [18]) (Prag. Benesch.) — [19]) pallens. Benesch. (Prag. Benesch.) — Hippocastani Opiz. [20]) (Prag. Benesch.) — vulgaris. (Prag. Kostelecky. Masner.) — nigricans. (Prag. Benesch.) — rosea. (Cöln Schlmeyer.) — *Tulipa* sylvestris. L. (Prag. Opiz.) — gesneriana. L. (Mann.) — *Turritis* Gerardi. Bess. (Prag. Mann.) — glabra. L. (Prag. Kostelecky. Böhmischaicha in Böheim. Prochaska.) — patula Ehrh. (Ofen. Pesth. Lang.) — *Tussilago* alpina. L. (Brunberg im Riesengebirg. Eisenstein. Haynborf am Isergebirge. Petters) — Farfara. L. (Prag. Moschner.) — Petasites. L. (Ober-

[17]) *Agropyrum mucronatum*. Opiz. spica disticha, stricta; glumis subseptemnervibus, mucronulatis; flosculis muticis, inferioribus apice emarginatis; rachi ad angulos hispido; vaginis glabris; foliis scabris, supra glaucis, pubescentibus, subtus laevibus; radice repente. Opiz in Weihe's Sammlung deutsch. Gräser. Intermedium inter A. rigidum. P. et A. firmum. Seidl. In monte Petřin Pragae 1822. Opiz.

[18]) *Tubercularia* erumpens, solitaria, vel confluens, parva, subrotunda, planiuscula, laevissima, nitida, sordide rubra, demum fuscescens, intus concolor. Opiz. An abgestorbenen Aesten des Cytisus Laburnum. L. in den Wimmer'schen Anlagen nächst Prag. 1823. Opiz.

[19]) *Tubercularia* erumpens, aggregata, sub confluens, tuberculis irregularibus, pallide rubescentibus, intus albidis. Benesch. An abgestorbenen Bäumen von Juglans regia L. in den Wimmer'schen Anlagen nächst Prag. 1823 Benesch.

[20]) *Tubercularia* erumpens, solitaria, vel aggregata, subconfluens, saturate rubra, laevissima, nitida, intus pallidiora. Opiz. An Lindenrinde bei Prag. Benesch. T. Hippocastani. Opiz. Böheims Gewächse. s. 150.

krč bei Prag. Opiz.) — intermedia (Glanek bei Salzburg. Hinterhuber.) — alba. L. (Kühberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — alba fömina W. (Kühberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — alba hermaphrodita. W. (Kühberg eb. Hinterhuber.) — nivea. Hoppe. (Kühberg eb. Hinterhuber.) — nivea fömina. Willd. (Kühberg eb. Hinterhuber.) — Petasites hybrida. Frohnburgerhof nächst Salzburg. Hinterhuber.) — *Ulex* europaeus. L. (Dresden. Bauer. Minden. Weihe.) — *Ulmus* effussa. Willd. (Prag. Kostelecky.) — campestris. L. (Prag. Maly.) — *Ulva* Linza. (baltisches Meer. Mann.) — granulata. (Böheim. Mann.) — *Urceolaria* cinerea polygonia. Achar. (Prag. Günther.) — scruposa α. Achar. (Prag. Mann.) — *Uredo* Andropogi. Opiz. [21]) (Dablizerberg bei Prag. Benesch.) — cichoracearum Lapsanae communis. Opiz. (Krummau in Böheim. Jungbauer.) — *Uredo* farinosa Caprearum Salicis auritae. Opiz. (Riesengebirge. Masner. — Mann.) — farinosa Caprearum Silicis capreae. Opiz. (Prag. Masner.) — Hyacinthi. Opiz. [22]) (Podbaba bei Prag. Benesch.) — longissima. Opiz. [23]) (Ka ſerwi ſe nächſt Prag. Benesch.) — ovata Populi dilatatae. Opiz. (Hetzinſel bei Prag. Benesch. Neuhof čaſl. Kr. Chotek.) — ovata Populi tremulae. Opiz. (Prag.

---

[21]) *Uredo (Ustilago.)* Pulvere tennissimo, fusco-purpureo loco spicis e membrana utriculosa, cylindrica, apice attenuata, erumpente. Opiz. Statt der Aehren in Andropogen angustifolius Sib. et Sm. auf dem Dablizerberg bei Prag. Opiz.

[22]) *Uredo* in maculis ovatis oblongisve, copiosa, circulariter aggregata ovato-subrotunda, plumbea, longitudinaliter dehiscentia; sporulis fusco-spadiceis, ovatis, mucronatis. Opiz. an grünen Blättern des Hyacinthus comosus L. Benesch. U. Hyacinthi. Opiz. Böheims Gew. ſ. 148.

[23]) *Uredo* linearis, longissima, parallella, plumbea; sporulis minutissimis, bruneis. Opiz. Böheims Gew. p. 148. Lycoperdon filiforme Schrank. in Hoppe's bot. Taſchenb. a. d. J. 1793. p. 169. Auf grünen Blättern der Poa aquatica. L. Opiz.

Masner.) — Potentillae. DeC. (Podbaba. Benesch.) — Sedi. (A. Bartenstein.) — segetum avenae. (Gemnisst in Böheim. Chotek.) — polymorpha Salicis. (Neuhof čaſl. Kr. Chotek.) — Tussilaginis. Pers. (Degwic nächſt Prag. Opiz.) — bifrons. Lamark. (Prag. Opiz.) — Aegopodii. Straufs. (Prag. Mann.) — Ornithogali. Kunze. (Krummau. Jungbauer.) — farinosa Salicis. (Krummau. Jungbauer.) — gyrosa. Rebentisch. (Langeberg bei Leitmeriz. Opiz.) — tremellosa Ringentium Euphrasiae (Krummau. Jungbauer.) — Euphorbiae Helioscopiae (Krummau. Jungbauer.) — apiculata Violae. (Krummau. Jungbauer.) — polymorpha Polypodii. (Krummau. Jungbauer.) — Cytisi Cytisi nigricantis. (Krummau. Jungbauer.) — Tragopogi. (Bubenč. Chotek. u. Kaiſerwieſe nächſt Prag. Opiz.) — Alchemillae. (Krummau. Jungbauer.) — linearis (Prag. Austerliz.) — Menthae. (Krummau. Jungbauer.) — suaveolens. (Leipzig. Reichenbach. — Radotin berauner Kreis. Opiz.) — Ficariae. (Prag. Streinz. Baumgarten. Ramisch.) — populina. (Žižkaberg nächſt Prag. Austerliz.) — cubica (Krummau. Jungbauer.) — Violae (Krummau. Jungbauer.) — miniata Lini. (Troja nächſt Prag. Austerliz.) — ovata Betulae (Neuhof čaſlauer Kreis. Chotek.) — apiculata Arctii. (Prag. Moschner.) — Fabae. (Leipzig. Reichenbach.) — Sii falcariae. Opiz. [24]) (Böhmiſchaicha. Prochaska. Prag. Benesch.) — tremellosa Senecionis. (Leipzig. Reichenbach. Böhmiſchaicha. Benesch.) — farinosa Senecionis (Böheim. Benesch.) — Campanulae (Prag. Masner.) — Mei sibirici. (Leipzig. Reichenbach.) — Alchemillae hybridae. (Thüringen. Reichenbach.) — Candida. (Prag. Masner. Huzelmann. Leipzig. Reichenbach.) — Polypodii fragilis. (Leipzig. Gerhard.) — ambigua (Gerhard.) — Euphorbiae. (Gerhard.) — populina betulina (Gerhard.) — segetum Hordei vulgaris (Prag. Ramisch. Opiz.) — striola. Straufs. (Gerhard.) *Urtica* pilulifera L. (Kostelecky.) — urens. L. (Schönwalde.

---

[24]) *Uredo* sparsa, salitaria, ovato vel subrotunda, minima, irregulariter dehiscentia; sporulis minutissimis, fuscospadiceis. Opiz. An grünen Blättern des Sium Falcaria L. Prochaska.

Petters.) — Dodartii. L. (Kostelecky.) — canadensis. L. Günther.) — *Usnea* florida. Achar. (Slawětin. čaſl. Kr. Eisenstein. Blanſko bučw. Kr. Jungbauer.) — hirta. Ach. (Reinegger.) — plicata Ach. (Reinegger.) — barbata. Achar. (Regensburg. Fürnrohr.) — *Ustilago* segetum Hordei. (Neuhof čaſl. Kr. Chotek.) — utriculosa. Nees. (Oſchic bunzl. Kr. Benesch.) — decipiens. (Podbaba bei Prag. Opiz.) — *Vaccinium* Myrtillus. L. (Žižkaberg bei Prag. Opiz.) — uliginosum. L. (Hirſchberg bunzl. Kr. Praesens.) — *Vailantia* cherſonensis. (Fr. v. Braun,) — ciliata. Opiz. [25]) (Stern bei Prag. Opiz. Kostelecky.) — cruciata. L. (Chotek.) — glabra vom Hrn. Profeſſor Hackl iſt V. cruciata. L. Grabowsky. — hispida. (Steudel.) — muralis. L. (Moschner.) — *Valeriana* celtica. L. (Admont. Sommerauer.) — Phu. L. vom Hrn. Wundarzt Nenning iſt V. officinalis. L. Mann. — sambucifolia. Mickan. (Schleſien. Grabowsky.) — saxatilis. L. (Salzburg. Hinterhuber. Kalbing in Steiermark. Sommerauer. C. Bartenstein.) — officinalis latifolia. Vahl. (Böhmiſchaicha. Prochaska.) — officinalis tenuifolia. Vahl. (Leipzig. Gerhard.) — dioica. L. (Eule in Böheim. Moschner.) — *Variolaria* communis faginea. Achar. (Böheim. Mann.) — corallina. Achar. (Pleiswedel leitmeriz. Kr. Opiz.) — communis. Achar. (Rathenow in der Mark Brandenburg. Gansauge. — *Verbascum* Blattaria. L. (Daſſic chrudim. Kr. Mann.) — phoeniceum. L. (Prag. Moschner.) — pyramidatum. Bieberst. (C. Bartenstein.) — *Veratrum* album. L. (Gráz. Speckmoser.) — *Verbascum* Lychnitis. L. (Prag. Mann.) — Thapsus. L. (Weltrus rakonizre Kr. Chotek.) — *Verbenna* supina. L. (Kostelecky.) — triphylla. L. (Speckmoser.) — *Vernonia* novaeboracensis. W. vom Hrn. Med. Assessor Günther iſt V. praealta. W. Mann. — *Veronica* alpina. L. (Admont

---

[25]) *Vailantia*, foliis quaternis, elliptico-oblongis, trinerviis, reticulatis, hispidis; pedunculis ramosis, ciliatis, bracteatis; bracteis oblongis, ciliatis; fructibus glabris. Presl. flor. cechic. N. 230. Gemein durch ganz Böheim in ſchattigten Gegenden. 4

in Steyermark. Speckmoser.) — aphylla. L. (Schneeberg in N. Oestreich. Praesens.) — bellidioides. L. (Steyermark. Sommerauer.) — Chamaedrys. L. (Gemnischt in Böheim. Chotek.) — longifolia. L. (Hohenfurth budweis. Kr. Nenning.) — maritima. L. (Gráz. Speckmoser.) — media. Schrader. (Speckmoser.) — orchidea. Crantz. (Agram in Ungarn. Lang.) — persica. Poir. (Kostelecky.) — polita. Fries. (Minden. Weihe.) — praecox. Allion. (Cunersdorf nächst Berlin. Walter.) — prostata. L. (Prag. Kostelecky.) — pulchella. Bernh. (Kostelecky.) — saxatilis. L. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — Schmidtii R. et S. (Reinegger.) — agrestis. L. (Prag. Kostelecky.) — Anagallis. L. (Prag. Eisenstein.) — arvensis. L. (Prag. Kostelecky.) — Beccabunga. L. (Prag. Kostelecky.) — hederaefolia. L. (Prag. Kostelecky.) — latifolia. L. (Prag. Kostelecky.) — officinalis. L. (Böhmischaicha bunzl. Kr. Prochaska. Königsaal braun. Kr. Kostelecky.) — scutellata. L. (Karlstein braun. Kr. Opiz.) — serpillifolia. L. (Eule. Moschner.) — spicata. L. (Königsaal. Opiz. Prag. Kostelecky.) — triphyllos. L. (Prag. Moschner.) — cymbalariifolia. Bertol. (Weihe. Kostelecky.) — glabra. Schrader. (Speckmoser.) — virginica. L. (Günther.) — *Verrucaria* analepta. Achar. (Prag. Mann.) — punctiformis. Achar. (Prag. Mann.) — punctiformis ptelaeoides. Achar. (Vor dem Baumgarten bei Prag. Opiz.) — Schraderi Achar. (Brünn. Hochstetter. Prag. Mann.) — stigmatella (Böheim. Mann.) — *Viburnum* Tinus. L. (Maly.) — Lentago. L. (Mann. Maly.) — Opulus. L. (Oestreich. Chotek. — Blanik in Böheim. Eisenstein.) — *Vicia* angustifolia. Roth. (Lausiz. Burckhardt.) — bicolor. W. (Kostelecky.) — cordata. Wulf. (Böhmischaicha. Prochaska.) — Gerardi. Jacq. (Prag. Mann.) — hybrida. L. (Weihe.) — lathyroides. L. (Scharka. Eisenstein. Baumgarten bei Prag. Maly.) — sordida. W. et K. (Kostelecky.) — striata. M. Bieberst. (Kostelecky.) — cracca. L. (Prag. Moschner.) — Faba. L. (Moschner.) — pisiformis. L. (Prag. Kostelecky.) — polyphylla. Desf. (Vácz in Ungarn. Lang.) — sativa. L. (Prag. Chotek.) — sepium. L. (Prag. Kostelecky.) — tenuifolia.

Roth. (Prag. Adamowsky.) — monantha. Desf. (Moschner.) — narbonensis. L. (Seidl.) — atropurpurea. Desf. vom Hrn. M. Dr. Weihe iſt V. segetalis. Thuillier. Maly. — *Villarsia* nymphoides. (Smiřic fónigr. Kr. Mann.) — *Vinca* minor foliis variegatis, flore albo. (Walter.) — roseo flore albo. (Chotek.) — herbacea. W. et K. (Ofen. Lang.) — rosea. L. (Speckmoser. — Reinegger.) — *Viola* cruenta. H. Weim. (Braun.) — glauca. M. Bieberst. (Moſkau. Goldbach.) — livida. Kitaib. (Adlersberg in Ungarn. Lang.) — montana. L. (Gráz. Speckmoser.) — parvula. Opiz. [26]) (Kuchelbad. Benesch.) — sudetica. Willd. (Glazer Schneeberg. Opiz.) — arvensis. Sibth. (Krummau. Bayer.) — biflora. L. (Rieſengebirg. Eisenstein.) — canina. L. (Scharka. Radlik. Opiz. Krazau. Petters.) — hirta L. (Prag. Kostelecky.) — mirabilis. L. (St. Prokop bei Prag. Kostelecky.) — tricolor. L. (Chotek.) — arenaria. Desf. (Prag. Palliardi.) — uniflora. L. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — ericetorum. Schrad. (Schleſien. Grabowsky.) — *Viscum* album. L. (Straſſic in Böheim. Eisenstein.) — *Vitis* Labrusca. L. (Walter.) — *Webera* pyriformis. (Heiligenblut. C. Bartenstein.) — *Wedelia* perfoliata. W. (Kostelecky.) — *Weissia* acuta. (Gaſtein. C. Bartenstein.) — curvirostra (Heiligenblut. C. Bartenstein.) — fugax. (Gaſtein. C. Bartenstein.) — lanceolata. (Regensburg. Fürnrohr.) — nigrita. (Gaſtein. C. Bartenstein.) — recurvirostra. (Rückmarsdorf. Gerhard. — Rathhauſerberg. Heiligenblut. C. Bartenstein.) — *Westringia* ros-

---

[26]) *Viola* acaulis, stolonibus nullis; foliis cordatis, pilosiusculis, crenato-serrulatis; petiolis piloso-hispidis; stipulis ciliato-dentatis; scapo foliis fere duplolongiore, glabro; bracteis infra medium pedunculi, lineari subulatis; calicibus obtusis, subglabris; petalis glabris; calcare obtuso. (Flores coerulei; folia nitentia.) Opiz. Habitat in apricis, e. g. in monte Petřin Pragae, ubi Aprili 1822 invenit Opiz. Differt praecipue a V. collina Besser cui proxima: foliis cordatis, scapo foliis duplolongiore.

mariniformis. Smith. (Masner.) — *Waldsteinia* geoides. W. (Grabowsky. Maria Einsiedel. Lang.) — *Xanthium* strumacium. L. (Netřeb. Chotek.) — spinosum. L. (Moschner.) — *Xeranthemum* annuum. L. (Kaisermühle nächst Prag. Opiz.) — *Ximenesia* encelioides. L. (Maun.) — *Xyloma* leucocreas. Lam. et Desf. (Stern. Ramisch.) — Salicinum umbonatum. Hoppe. (Kühthal in Böheim. Benesch.) — Acerinum. (Prag. Opiz) — rubrum. (Prag. Moschner. Opiz.) — Salicinum. (Leipzig. Reichenbach. Prag. Masner.) — verrucosum. Opiz.[27]) (Krummau budw. Kr. Jungbauer.) — Pteridis. (Böhmischaicha. Prochaska. — Krummau. Jungbauer.) — Alneum. (Krummau Jungbauer.) — Andromedae. (Masner.) — punctatum. (Hildburghausen. C. Bartenstein. — Stern. Ramisch. Tollsberg. Benesch.) — Aceris Pseudoplatani. (Leipzig. Reichenbach.) *Zaluzania* triloba. Cav. (Speckmoser. — Chotek.) — *Zannichellia* palustris. L. (Annětic nächst Prag. Opiz.) — *Zanthoxylum* fraxineum. W. (Maly.) — *Zapania* nodiflora. Pers. (Günther.) — *Zinnia* elegans. Jacq. (Adamowsky.) — pauciflora. L. (Moschner.) — verticillata. L. (Adamowsky.) — *Ziziphora* serpyllacea. Bieberst. (Speckmoser.) — capitata. L. (Maly.) — *Zögea* leptaurea. L. (Kostelecky.)

Acalypha brachystachia. Hornem. (Kostelecky.) — *Acer* leiocarpon. Opiz.[28]) (Prag. Masner. Wagner.) — microcarpon. Masner.[29]) (Prag. Masner.) — microphyllum. Opiz.[30])

---

27) *Xyloma* maculaeforme, maculis irregulariter angulatis, sanguineis, demum atro-sanguineis, rugosis, in aversa foliorum pagina brunneis, ochraceo-verrucosis. Opiz. Auf gelbwerdenden Blättern von Prunus Padus L. entdeckt vom Hrn. Schifffahrtsverrechner Jungbauer. 1808.

28) *Acer* foliis quinquelobis, obtusis, subtus holosericeis; fructibus glabris, immaturis viridibus; alis aequalibus, recurvatis. Opiz. Bei Prag. Opiz. 1823.

29) *Acer* foliis quinquelobis, acutis, subtus holosericeis; fructibus glabris, immaturis viridibus; alis minoribus, adscentibus. Masner. 1823.

30) *Acer* foliis quinquelobis, obtusis, subtus holosericeis

Prag. Masner.) — orthopteron. Masner. [31]) (Prag. Masner.) — polycarpon. Opiz. [32]) (Prag. Masner. Wagner.) — dasicarpum. Ehrh. (Maly.) — Negundo. L. (Speckmoser.) — *Achillea* ageratum. L. (Kostelecky.) — atrata. L. (Schneeberg in Oestreich. Reinegger.) — biserrata. Bieberst vom Hrn. M. C. Kostelecky ist A. Ptarmica. L. Maly. — Clavennae L. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — magna. L. (Chotek.) — millefolium alpestris. (Schlesien. Grabowsky.) — Millefolium fl. rubro. (Masner.) — Millefolium minor. (Georgenberg rafoniz. Kr. Chotek.) — Millefolium villosa. (Prag. Mann.) — moschata. Jacq. (Rothemannertauern in Steyermark. Sommerauer.) — nobilis. L. (Scharka. Masner.) — setacea. W. K. (Prag. Kostelecky.) — velutina. Desf. vom Hrn. Prof. Speckmoser ist A. compacta. Willd. (Maly) — sudetica. Opiz. [33]) (Sudeten. Masner et Wagner. Kleine Teich. ebend. Benesch) — serrata. Rez. (Speckmoser.) — speciosa. Sprengl. (Kostelecky.) — grandiflora. Bieberst. (Maly. Gün-

---

fructibus glabris, immaturis coloratis; alis aequalibus, horizontalibus. Opiz. Bei Kuchelbad, Opiz. 1823.

[31]) *Acer* foliis quinquelobis, obtusis, subtus holosericeis; fructibus glabris; immaturis viridibus; alis latis, adscendentibus. — Differt a A. austriaco-Trattinick. foliis subtus holosericeis; fructibus immaturis viridibus; alis latis, a A. eriocarpon. Opiz. fructibus glabris. Masner. In fruticetis ad Pragam jacentibus legit Jos. Masner. 1823.

[32]) *Acer* foliis quinquelobis, subtus holosericeis; fructibus glabris, immaturis viridibus; alis latissimis recurvatis. Opiz. Bei Prag 1823. Opiz.

[33]) *Achillea* foliis triplicato-pinnatifidis; laciniis lineari-setaceis, mucronatis, confertissimis, pilosis; corymbo composito, fastigiato; calycibus oblongo-ovatis; squamis atro-marginatis. (floribus roseis); radio erecto; radiis 3dentatis. Opiz. in Hesperus 1813. S. 623. *A. Haenkeana*. Tausch. caule villoso; foliis triplicato-pinnatisectis, subvillosis, laciniis omnibus linearibus, elongatis acuminatis, subintegris; corymbo composito, fastigiato.

ther) — *Achimenes* coccinea. Pers. (Chotek. Adamowsky.) — *Achyranthes* argentea. Lam. (Kostelecky.) — *Achyrophorus* radicatus muricatus. Mann. [34]) (Böheim. Mann.) — *Acmella* bupthalmoides. Rich. (Kostelecky. Speckmoser.) — *Aconitum* Braunianum. (Untersberg bei Salzburg. Hinterhuber.) — neomontanum. (Bartenstein.) — neubergense. Desf. (Gráz. Speckmoser.) — rigidum. Reichenb. (Sudeten. Masner.) — Störkeanum foliis variegatis (Maly.) — ochroleucum. α. Willd. (Günther.) — Störkeanum. Reichenb. (Masner. Maly.) — *Acynos* alpinus. P. (Schweiz. Burckhardt.) — *Aecidium* Ari. (Minden. Weihe) — asperifolii Anchusae officinalis. Opiz. (Bei Prag. Masner.) — Bupleuri. Opiz. (Kuchelbad bei Prag auf Bupleurum falcatum. L. Benesch.) — Fragariae. (Minden. Weihe.) — Orchidis. (Minden. Weihe.) — Stellariae nemorum. (Minden. Weihe.) — *Aethusa* Ammi. L. (Kostelecky.) — elata. Friedl. (Kostelecky.) — *Agrostema* coelirosa. L. (Bartenstein.) — *Agrostis* miliacea. L. (Maly.) — retrofracta. Willd. (Lomler.) — *Ajaga* reptans. L. vom Hrn. M. C. Ritter von Eisenstein ist Ajuga genevensis. L. Grabowsky. — *Alchemilla* truncata Tausch, vom Hrn. Metaphysiker Masner ist A. vulgaris. L. Mann. — *Alectoria* capillaris. (Reinegger.) — jubata. (Brühl in U. Oestreich. Reinegger.) — *Allium* microcephalum Tausch. (Kuchelbad nächst Prag. Benesch. Masner.) — riparium. Opiz. [35]) (Prag. Mann.) — rotundum. L. vom Hrn. Prof. Reinegger ist A.

Tausch. Botanische Zeitung. 1821. — Um den kleinen Teich auf dem Riesengebirge gesammelt im Julius 1812. Opiz.

[34]) *Achyrophorus* squamis calycinis carina muricatis. E Bohemiae sylvis. (Mann.)

[35]) *Allium* scapo tereti; foliis semicylindricis aequante; spatha ovata, pedunculis longiora; umbellis densis, globosis, petalis acutis, recurvis; staminibus simplicibus; corolla brevioribus. Opiz An den Moldauufern bei Prag. Intermedia inter A. schoenoprassum L. et A. sibiricum. L. Opiz.

scorodoprassum. L. Mann. — sphaerocephalum. L. (Troja nächst Prag. Masner.) — carinatum. L. (Gráz. Speckmoser.) — flavum. L. (Brünn. Hochstetter.) — Cepa. L. (Mann.) — *Alopecurus* fulvus. Smith. (Prag. Mann.) — *Alphitomorpha* adunca. Wallroth. (Prag. Benesch.) — *Althaea* hirsuta. L. vom Hrn. Prof. Reinigger ist es nicht. Huzelmann. — *Alyssum* campestre. L. vom Hrn. Großhändler Gerhard ist A. calycinum incanescens Wallroth. Opiz. — edentulum. W. K. (Maly. Kostelecky.) — micropetalum vom Hrn. M. D. Weihe ist A. calycinum β virescens. Wallroth. Opiz. — rupestre vom Hrn. Grafen von Chotek ist Camelina saxatilis pinnatifida. Opiz. dann Alyssum incanum. L. Opiz. — hirsutum. M. Bstr. (Kostelecky. Gerhard.) — *Amaranthus* laetus. Willd. (Adamowsky. Masner.) — retroflexus pusillus. Opiz. (Prag. Benesch.) — prostratus. Balbis. (Gráz. Speckmoser.) — gangetinus. L. (Gerhard.) — polygonoides. L. (Gerhard.) — parisiensis. Schkuhr. (Kostelecky.) — *Amethystina* coerulea. L. (Maly.) — *Amorpha* fruticosa. L. (Adamowsky.) — *Anacyclus* bicolor. P. (Kostelecky.) — valentinus. L. (Kostelecky.) — *Anchusa* hybrida. Tenore. (Kostelecky.) — *Andraea* alpina. (Párschenberg bei Schluckenau leitmeriz. Kr. Neumann.) — *Andropogon* angustifolius Sib. et Sm. (Prag. Mann.) — *Andryala* cheiranthifolia. Herit. (Kostelecky.) — *Anemone* virginiana. L. (Kostelecky.) — *Angelica* Archangelica. L. (Eisenach. Thon.) — *Anthemis* corymbosa. Heenke. (Kaibling bei Admont in Steyermark. Sommerauer.) vom Hrn. Prof. Speckmoser ist Achillea moschata. Maly. — Cotula L. vom Hrn. Apotheker Burckhardt ist A. fuscata. Willd. Maly. — fallax Willd. vom Hrn. M. C. Kostelecky ist nicht die Willdenow'sche. Maly. — montana. L. vom Hrn. M. D. Weihe ist A. saxatilis. Desf. Maly. — nigricans vom Hrn. Prof. Speckmoser ist A. tinctoria fl. albo. Maly. — secunderamea. Bivon. (Kostelecky.) — altissima. L. (Kostelecky.) — Cota. L. (Reinegger.) — mixta L. vom Hrn. M. et C. C. Moschner ist A. altissima. Willd. Maly. — Triumfetti. Allion. (Kostelecky.) — ruthenica. M. Bstn. vom Hrn. Med. Assessor Günther. ist A. arvensis. L. Maly. — *Anthoceros* laevis. (Jena. Thon.) —

Ich ersuche jedem vollständigen Pflanzenexemplar ein Zettelchen mit dem systematischen Namen, dem Auctor, dem Fundort und Finder beizufügen, und alle Exemplare einer Art in einen eigenen Umschlagsbogen mit gleicher Aufschrift, und der Bestellungsnummer versehen, zulegen, — alle Anzeigen streng alphabetisch zu reihen, und die wild wachsenden Pflanzen von den Cultivirten durch Zeichen zu unterscheiden.

Jene Herrn Abnehmer, welche nur Desideraten-Verzeichniße einsenden, erhalten für 100 Pflanzen, blos 75 Exemplare. Dagegen erhalten jene, welche ein streng alphabetisch gereihtes Herbars Verzeichniß einsenden, und alles nehmen, was sie in diesem nicht aufführen, u. z.

a) jene, welche sich in Böheim befinden, für 100 : 80 Pflanzen
b) = = = Deutschland und dem österreichschen Kaiserstaat, mit Ausschluß Italiens, befinden, für 100 : 90 =
c) jene, welche sich außer Deutschland und dem österreichschen Kaiserstaat befinden, mit Einschluß Italiens, für . . . 100 : 100 =
d) jene, welche sich außer Europa befinden für . . . . 100 : 120 =

Jene Herrn Abnehmer, welche obige Bedingniß eingehen, erhalten, wenn sie mir einen neuen Herrn Abnehmer verschaffen, der auch sein alphabetisches Herbars-Verzeichniß einsendet, und alles darin nicht aufgeführte nimmt, so lange dieser bei mir eine Pflanzenforderung haben wird, und zwar:

jene, welche a) für 100 : 80 Pflanzen erhielten, dann 100 Pfl.
= = b) = 100 : 90 = = = 120 =
= = c) = 100 : 100 = = = 150 =
und = = d) = 100 : 120 = = = 200 =

Prag, den 29. Januar 1824.

P. M. Opiz.